

## Препоръчителни имунизации от раждането до 17 годишна възраст.

Ваксина	Раждане	Месец										Година				
		1	2	3	4	6	7	12	13	16	6	7	11	12	17	
туберкулоза	BCG (1 )						BCG (2 )						BCG (2 )	BCG (2 )		BCG (2 )
дифтерия			D	D	D					D	D				d	d
тетанус			TT	TT	TT					TT	TT				TT	TT
коклюш			acP	acP	acP					acP	acP					
полиомиелит			IPV	IPV	IPV					IPV	IPV					
хемифилус инфлуенце инфекция тип Б			Hib	Hib	Hib					Hib						
Хепатит В	НерВ (3 )	НерВ				НерВ										
Стрептококкус пневмония			PCV	PCV	PCV			PCV								
морбили									MEAS						MEAS	
паротит (заушка)									MUMPS						MUMPS	
рубела									RUBE						RUBE	
човешки папилома вирус															HPV (4 )	

### Забележки:

1: Администриране 48-часа след раждане

2: Само след негативен Monotoux тест

3: Администриране до 24-часа след раждане

4: HPV ваксинацията не е включена в Националната имунизационна програма. Тази ваксинация е доброволна но безплатна за момичета на 12-годишна възраст.

	Осовни препоръки за България
	Препоръки за специфични групи само за България
	Допълване (ако предишен период е изпуснат) за България

### Важни забележки:

Повече информация е налична на: <http://www.ncipd.org/en/?category=6&section=9>

Съдържанието на този доклад е покрит от правната информация на Европейския център за превенция и контрол на болестите (ECDC) Виж: <http://ecdc.europa.eu/en/pages/legalnotice.aspx>

Доклада отразява статуса на подадени и заверени заявки във ваксинационната програмна платформата на ECDC към дата Юли 2014-та година